

<i>Edad</i>	<i>Hepatitis B¹</i>	<i>Polio inyectable (VPI)</i>	<i>DTPa</i>	<i>Varicela²</i>	<i>HIB</i>	<i>Triple virica</i>	<i>Meningococo C³</i>	<i>Papilomavi- rus</i>
Al nacer	1ª dosis							
2 meses	2ª dosis ⁴	1ª dosis	1ª dosis		1ª dosis		1ª dosis	
4 meses		2ª dosis	2ª dosis		2ª dosis			
6 meses	3ª dosis	3ª dosis	3ª dosis		3ª dosis		2ª dosis	
15 meses						1ª dosis		
18 meses		4ª dosis	4ª dosis		4ª dosis		3ª dosis	
5-6 años			5ª dosis			2ª dosis		
11 años				1ª dosis				
14 años			6ª dosis (Td) ⁵					Tres dosis ⁶

DTPa: difteria, tétanos, pertusi acelular.

Td: tétanos difteria, presentación de adultos

- 1) Se completará la pauta de tres dosis en todos los menores de 20 años no vacunados.
- 2) Se administrará una sola dosis en niños/as sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación.
- 3) Se vacunara con una dosis de vacuna conjugada frente al meningococo C a los menores de 20 años no vacunados
- 4) Los hijos de madres portadoras del HBsAg deberán recibir la segunda dosis de vacuna frente a la hepatitis B al mes del nacimiento.
- 5) Vacuna Td: se recomienda una dosis de recuerdo cada 10 años.
- 6) Se administraran tres dosis en niñas según indicación de la ficha técnica de la vacuna disponible.