

Enfermedad por virus Ébola (EVE). Contexto: Brote iniciado en Guinea Conakry

INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE POSIBLES CASOS DE EVE

(ver apartado "Distribución de funicones" y otros apartados en "Procedimiento de actuación")

Si se considera como posible diagnóstico, enfermedad por virus Ébola, se deben tomar medidas de control de la infección (aislamiento del paciente, uso del equipo de protección personal* por parte del personal que le atiende y de la mascarilla quirúrgica por parte del paciente) desde el inicio de la investigación. Ver doc "Procedimiento completo" para detalles.

Criterios para considerar un caso en investigación:

Paciente que presenta:

- **CRITERIO CLINICO:**

-Fiebre elevada (>38,3°C) y manifestaciones hemorrágicas (exantema o petequias, epistaxis, hemoptisis, hematemesis, melenas o cualquier otra evidencia de sangrado, externo o interno)**

O

-Fiebre elevada (>38,3°C) Y Al menos 2 de los siguientes: mialgias, cefalea, odinofagia, vómitos, diarrea

Y

- **CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO (durante los 21 días previos a inici síntomas)**

-Estancia en una de las áreas donde ha habido casos de EVE

O

-Contacto con un caso (en investigación o confirmado) de EVE o con sus fluidos corporales/muestras biológicas

Caso descartado
Tratamiento sintomático y diagnóstico diferencial con otras enfermedades

No se cumplen

(ver "circuito de caso" en "Procedimiento de actuación")

Hospitalización

- Aislamiento del paciente en habitación individual.
- Medidas de control de la infección: Equipo de protección personal* para el personal que le atiende.
- Inicio de las pruebas diagnósticas. Gestion de muestras. Prioridad diagnóstica
- Inicio del tratamiento de soporte

Notificación inmediata al servicio de Epidemiología o a la Unidad Insular de Epidemiología correspondiente.
Notificación desde S.Epi a CNE yCCAES

Envío de muestras al CNM

-

+

- Caso descartado de EVE
- Finalización búsqueda y seguimiento de contactos
- Tratamiento e investigación de otras causas

- Caso confirmado de EVE
- Mantener medidas de control de la infección
- Continuar tratamiento de soporte
- Seguimiento de contactos

Se cumplen

Caso en investigación

Inicio búsqueda y seguimiento de contactos

*ver "Prevención y control de la infección en los centros sanitarios" en "Procedimiento actuación"

** Se debe descartar cualquier otra causa de enfermedad febril y/o diátesis hemorrágica.